

CLAMÍDIA + GONORRÉIA



INÍCIO

CONSULTA DE
ENFERMAGEM/MÉDICO

COLETAR O SWAB NA UBS E
ENCAMINHAR AO LAB. MUNICIPAL

- DADOS DO PACIENTE (NOME,
DN, CPF, CNS, TELEFONE,
MOTIVO DA COLETA)

LABORATÓRIO MUNICIPAL
ENCAMINHA AO LACEN (EM NO
MÁXIMO 7 DIAS) E PREENCHE O
GAL

- LAUDO SERÁ ANEXADO NO G-MUS
- PLANILHA NO DRIVE:
LAB. MUNICIPAL INFORMA QUE O
RESULTADO ESTÁ DISPONÍVEL

SOLICITAR MATERIAL
JUNTO NO EMAIL DOS
PEDIDOS DE TESTE
RÁPIDO

O SÍTIO DE COLETA DEPENDE DA PRÁTICA SEXUAL:
SEXO ORAL = MATERIAL DE OROFARINGE
SEXO ANAL = SWAB ANAL
SEXO VAGINAL = SWAB VAGINAL
SEXO INSERTIVO = MATERIAL URETRAL

QUEM	QUANDO			
	HIV ^a	Sífilis ^b	Clamídia e gonococo ^c	Hepatites B ^d e C ^e
Adolescentes e jovens (≤30 anos)	Anual		Ver frequência conforme outros subgrupos populacionais ou práticas sexuais	
Gestantes	Na primeira consulta do pré-natal (idealmente, no 1º trimestre da gestação); No início do 3º trimestre (28ª semana); No momento do parto, ou em caso de aborto/natimorto, independentemente de exames anteriores Em caso de aborto/natimorto, testar para sífilis, independentemente de exames anteriores.		Na primeira consulta do pré-natal (Gestantes ≤30 anos)	Hepatite B: na primeira consulta do pré-natal (idealmente, no primeiro trimestre) ^f Hepatite C: na primeira consulta do pré-natal
Gays e HSH	Semestral		Ver frequência conforme outros subgrupos populacionais ou práticas sexuais	Semestral a anual
Profissionais do sexo				
Travestis/transsexuais				
Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas				
Pessoas com diagnóstico de IST	No momento do diagnóstico e 4 a 6 semanas após o diagnóstico de IST		No momento do diagnóstico	No momento do diagnóstico
Pessoas com diagnóstico de hepatites virais	No momento do diagnóstico	–	–	–
Pessoas com diagnóstico de tuberculose	No momento do diagnóstico	–	–	–
PVHIV	–	Semestral	No momento do diagnóstico	Semestral a anual
Pessoas com prática sexual anal receptiva (passiva) sem uso de preservativos	Semestral			Semestral a anual
Pessoas privadas de liberdade	Anual	Semestral	–	Semestral a anual
Violência sexual	No atendimento inicial; 4 a 6 semanas após exposição e 3 meses após a exposição	No atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição		Hepatite B: no atendimento inicial e de acordo com a profilaxia pós-exposição instituída ^g Hepatite C: no atendimento inicial, 4 a 6 semanas e 4 a 6 meses
Pessoas em uso de PrEP	Em cada visita ao serviço	Trimestral	Semestral	Trimestral
Pessoas com indicação de PEP	No atendimento inicial; 4 a 6 semanas após exposição e 3 meses após a exposição	No atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição	No atendimento inicial e 4 a 6 semanas após exposição (exceto nos casos de acidente com material biológico)	Hepatite B: no atendimento inicial e de acordo com a profilaxia pós-exposição instituída ^g Hepatite C: no atendimento inicial, 4 a 6 semanas e 4 a 6 meses